

## INFO-MÉDICAMENT

### QUINOLONES INTRAVEINEUSES EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

Ciprofloxacin

Levofloxacin

Moxifloxacin

POSOLOGIE : \_\_\_\_\_

#### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

#### 2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Les sacs se conservent à la température ambiante (15-30°C) et à l'abri de la lumière.
  - Sortir le sac de l'emballage en aluminium juste avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

#### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Mentionnez à votre pharmacien toutes les allergies dont vous souffrez avant de débuter votre traitement.
- Aviser le médecin ou le pharmacien avant de débuter un médicament que vous ne consommiez pas durant votre séjour à l'hôpital.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

#### 4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements
- Selles molles, diarrhées ou constipation
- Maux de tête, troubles du sommeil, sensation de fatigue.
- **Peau sensible au soleil.** Appliquez un écran solaire si exposition au soleil.

#### 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

#### OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.
- L'apparition des symptômes suivants : douleur, sensation de brûlure, fourmillements, engourdissements, faiblesse et changement de la sensation au toucher au niveau des bras et des jambes.