

INFO-MÉDICAMENT

TIGÉCYCLINE INTRAVEINEUSE EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

POSOLOGIE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée ou si elle contient des particules en suspension.
- À noter, ce médicament est de couleur jaune.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements
- Selles molles, diarrhées ou constipation
- **Peau sensible au soleil.** Appliquez un écran solaire si exposition au soleil.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Des nausées ou vomissements importants ou qui persistent.
- Une douleur importante à l'estomac pouvant se propager jusqu'au niveau du dos.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.