

INFO-MEDICAMENTO

VANCOMICINA INTRAVENOSA EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

DOSIS: _____

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Guardar en el centro del refrigerador (sobre una repisa; evitar en la puerta del refrigerador).
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Tome siempre su medicación a las horas que le han sido indicadas.
- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Si es necesario, es importante hacerse los análisis de sangre que se le hayan prescrito para que el equipo médico pueda asegurarse de que el tratamiento es eficaz y seguro.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Náuseas y/o vómitos
- Heces blandas, diarrea o estreñimiento
- La aparición de fiebre, escalofríos, aturdimiento y enrojecimiento o comezón en la cara, cuello, pecho, espalda y/o brazos durante la perfusión. La reacción comienza aproximadamente 10 minutos después del inicio de la perfusión y desaparece 15 minutos después del final de la perfusión. Esta reacción puede evitarse administrando vancomicina durante un periodo más largo.

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

○ UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Náuseas o vómitos severos o persistentes.
- Un cambio en la frecuencia o cantidad de orina, una disminución de la audición o zumbidos en los oídos. En ese caso, hable inmediatamente con su médico.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.
- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.