

INFO-MÉDICAMENT

VANCOMYCINE INTRA VEINEUSE EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

POSOLOGIE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Toujours prendre votre médicament en respectant les heures d'administration qui ont été déterminées pour vous.
- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements
- Selles molles, diarrhées ou constipation
- L'apparition lors de la perfusion de fièvre, frissons, étourdissements et de rougeur ou démangeaisons au niveau du visage, du cou, du thorax, du dos et/ou des bras. La réaction débute environ 10 minutes après le début de la perfusion et disparaît 15 minutes après la fin de la perfusion. Cette réaction peut être évitée en administrant la Vancomycine sur une période plus longue.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Des nausées ou vomissements importants ou qui persistent.
- Un changement dans la fréquence ou la quantité des urines. . Dans ce cas, parlez-en immédiatement à votre médecin.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.