

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION CÉFÉPIME

---

## IV direct

### MÉDICAMENT :

CÉFÉPIME (Maxipime<sup>MD</sup>)

### POSOLOGIE :

IV aux 8, 12 ou 24 heures

### TEMPS D'ADMINISTRATION :

5 minutes

### PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution de céfépime à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Prélever le volume de médicament requis dans une seringue de format de 10 ml ou plus

Mettre un bouchon stérile

### DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 100 mg/ml : 9 jours au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.

### RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 23 mars 2018.
3. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 17/01/2018.