

PROTOCOLE DE PRÉPARATION CÉFOTAXIME Q12H

IV par pompe

MÉDICAMENT :

CÉFOTAXIME (Claforan^{MD})

POSOLOGIE :

IV aux 12 heures

SOLUTÉ :

NaCl 0,9%

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution de céfotaxime de **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Ajouter le volume de médicament requis dans le soluté correspondant

Ordonnance	Fabrication		
	Dose quotidienne (mg)	Volume de médicament (ml)	Format du soluté (ml)
1000	2000	20	250
1500	3000	30	250
2000	4000	40	250

Enlever air du soluté

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 0,5-40 mg/ml : 5 jours au réfrigérateur ou 24 heures à température pièce.

PROGRAMMATION :

Dose aux 12 h (mg)	Volume résiduel (ml)	Volume de dose (ml)	Durée de dose (h)	Cycle de dose (h)	Débit MVO (ml/h)
1000	295	135	1,5	12	0,5
1500	305	140	1,5	12	0,5
2000	315	145	1,5	12	0,5

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Sanofi-Aventis. Monographie américaine révisée février 2015; Consultée en ligne le 19/04/2018.