

PROTOCOLE DE PRÉPARATION CÉFUROXIME

IV direct

MÉDICAMENT :

CÉFUROXIME (Zinacef^{MD})

POSOLOGIE :

IV aux 8, 12 ou 24 heures

DILUANT :

NaCl 0,9%

TEMPS D'ADMINISTRATION :

5 minutes

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution de céfuroxime à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Prélever le volume de médicament requis dans une seringue de format de 10 ml ou plus

Ajouter un volume de diluant équivalent au volume de médicament dans la seringue

Mettre un bouchon stérile

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour **concentration finale de 50 mg/ml** : 9 jours au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 22 août 2018.
3. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 22 août 2018