

PROTOCOLE DE PRÉPARATION COLISTIMETHATE

IV par pompe

MÉDICAMENT :

COLISTIMETHATE (Colymycin^{MD})

POSOLOGIE :

IV aux 8 ou 12 heures

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 4 mg/ml : 48 heures au réfrigérateur et 30 heures à température pièce. Toutefois, l'exposition à température pièce accélère la génération d'un métabolite toxique (colistin).

AUCUNE recette n'a pu être
établie pour ce mode
d'administration.

PASSER à une administration
par Intermate^{MD} qui est le seul
mode d'administration
possible pour ce médicament.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 4 juin 2018.
3. Wallace SJ, Li J, Rayner CR, et al: Stability of colistin methanesulfonate in pharmaceutical products and solutions for administration to patients. Antimicrob Agents Chemother: 2008. 52: 3047-51.
4. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 05/06/2018.