

PROTOCOLE DE PRÉPARATION GENTAMICINE Q24H

IV par pompe

MÉDICAMENT :
GENTAMICINE (Garamycin^{md})

POSOLOGIE :
IV aux 24 heures

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :
Pour concentration de 1,2 mg/ml : 48 heures au réfrigérateur OU 30 heures à température pièce. **Donc**, conservation maximale des sacs au frigo de 48 heures avant l'installation sur le patient.

AUCUNE recette qui respecte
à la fois la concentration ainsi
que le temps d'administration
maximal de la gentamicine n'a
pu être établie pour cet
intervalle posologique et ce
mode d'administration.

PASSER à l'Intermate^{md}.

RÉFÉRENCES :

1. Goodwin SD, Nix DE, Heyd A, Wilton JH. Compatibility of ciprofloxacin injection with selected drugs and solutions. Am J Hosp Pharm. 1991 Oct;48(10):2166-71.
2. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
3. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulé en ligne via Lexicomp le 21 mars 2018.