

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION IMIPÉNEM-CILASTATINE

---

## IV par pompe

### MÉDICAMENT :

IMIPÉNEM-CILASTATINE (Primaxin<sup>MD</sup>)

### POSOLOGIE :

IV aux 6, 8 ou 12 heures

### DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 2,5 mg/ml : 24 heures au réfrigérateur ou 4 heures à température pièce.

N.B. Ancienne donnée pour concentration de 2,5 mg/ml non retrouvée dans la littérature actuelle: 103 heures au réfrigérateur ou 15 heures à température pièce.

**AUCUNE** recette qui respecte  
une stabilité minimale de 24  
heures à température pièce n'a  
pu être établie pour ce mode  
d'administration.

**PASSER** à une administration  
par Intermate<sup>MD</sup> qui est le seul  
mode d'administration  
possible pour ce médicament.

### RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 21 mars 2018.