PROTOCOLE DE PRÉPARATION PIPÉRACILLINE-TAZOBACTAM

IV Intermate[MD] (Baxter)

MÉDICAMENT :
PIPÉRACILLINE-TAZOBACTAM (Tazocin[MD])

POSOLOGIE :
IV aux 8 ou 12 heures
IV aux 4 ou 6 heures : favoriser pompe

DILUANT :
NaCl 0,9%

TEMPS D'ADMINISTRATION :
30 minutes

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :
Utiliser solution de pipéracilline-tazobactam à **172 mg/ml** de pipéracilline, équivalent à **194 mg/ml** de pipéracilline-tazobactam (reconstituée avec eau stérile)

Prélever le volume de médicament requis
Injecter dans le modèle d'Intermate[MD] correspondant
Ajouter le volume de diluant requis pour l'obtention d'un volume final préétabli

Ordonnance	Fabrication		
Dose (mg)	**Volume de médicament (ml)**	**Modèle d'Intermate[MD]**	**Volume de diluant (ml)**
500 à 999*	2,9 à 5,8, selon dose	SV100[Δ]	Compléter pour volume final de 50 ml
1000 à 4000†	5,8 à 23,3, selon dose	SV200	Compléter pour volume final de 100 ml

* Dose exprimée en équivalent pipéracilline (500 à 999 mg = 563 à 1 124 mg de pipéracilline-tazobactam).
† Dose exprimée en équivalent pipéracilline (1000 à 4000 mg = 1125 à 4500 mg de pipéracilline-tazobactam).
Δ Le temps d'administration pourrait être inférieur à celui indiqué en raison du sous-remplissage de l'Intermate[MD]

Purger la tubulure

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :
Pour concentration de 10-80 mg/ml de pipéracilline sans EDTA : 7 jours au réfrigérateur **OU** 24 heures température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Intermate/Infusor Drug Stability Information. Ontario, Canada: Baxter Corporation; October 2008

Rédigé le 2018-03-23, puis dernière révision en octobre 2024 et publication le 2024-12-10