

Annonce

L'équipe de l'UsOpMed s'agrandit!

Depuis le 4 avril dernier, nous avons le plaisir d'accueillir les pharmaciennes Audrey Cloutier et Marie-Ève Poisson au sein de notre équipe. Nous leur souhaitons la bienvenue !

L'UsOpMed ayant maintenant vu le jour il y a un peu plus de 2 ans, nous procédons actuellement à une révision de notre mandat et de nos objectifs afin de mieux cibler nos interventions. Au cours des prochains mois, nous profiterons de l'occasion également pour vous présenter un bilan de nos réalisations depuis la création de l'équipe. Le tout vous sera diffusé d'ici la période estivale.

Nous tenons à vous rappeler également que les références/documents cliniques qui sont disponibles sur le K : seront retirés considérant que ces informations se retrouvent dans le sharepoint [Références UsOpRx](#).

N'hésitez pas à nous soumettre des documents à ajouter en utilisant [ce formulaire](#).

Ordonnances individuelles standardisées (OIS)

Les réactifs de lecture du temps de céphaline activée (TCA) ont été modifiés le 6 mars 2025 uniquement pour les sites de Charlevoix (aucun changement des valeurs thérapeutiques de Portneuf).

Les nomogrammes d'ajustement des perfusions d'héparine IV et les conduites à privilégier pour maintenir la perfusion d'héparine dans la cible du nouveau TCA thérapeutique ont donc été révisés au niveau des ordonnances individuelles standardisées (OIS) suivantes :

- [Héparine intraveineuse cardiologie](#)
- [Héparine intraveineuse générale excluant la cardiologie](#)

Également, de nouvelles OIS harmonisées pour l'ensemble du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont aussi disponibles pour l'utilisation de l'[amiodarone IV](#), du [diltiazem IV](#) ainsi que de l'[épinéphrine IV](#) chez l'adulte.

Elles remplacent donc maintenant tout autre formulaire antérieurement utilisé pour ces médicaments.

Outils cliniques – Rappels importants

Si ce n'est pas déjà fait, nous vous rappelons de consulter les notes de service suivantes :

- [Index de références pour l'administration de médicaments critiques injectables chez l'adulte](#)
- [Guide de dilution et administration des antibiotiques intraveineux](#)

Nouveauté

Arrondissement des doses de vancomycine et d'aminosides

Le comité de pharmacologie a entériné la proposition d'arrondissement des doses de vancomycine au 250 mg près et des doses d'aminosides au 20 mg près.

Vous pouvez consulter le document détaillé explicatif [ici](#).

Cet élément a été mis à jour dans le [Guide de dilution et administration des antibiotiques intraveineux](#).

**ENSEMBLE,
AU SERVICE
DE L'HUMAIN.**