

Heures visées pour ATIVAD chez l'adulte*

Ce tableau exclut : acyclovir, amikacine, amphotéricine B, colistiméthate, ganciclovir, gentamicine, tobramycine, vancomycine. Pour ces antibiotiques ou si administration par perfusion prolongée est souhaitée, contacter le pharmacien.

Posologie	Heure de début de la dernière dose	Prochaine(s) dose(s)	Heure(s) visée(s)
Infuseur ou seringue – patient autonome : <u>Auto-administration</u>			
DIE	Entre 00h et 19h	7h le lendemain	7h
	Entre 19h et 00h	Le lendemain autour de 14h puis le surlendemain 7h	
BID	Entre 00h et 13h	19h	7h - 19h
	Entre 13h et 00h	7h le lendemain	
TID	Entre 00h et 10h	14h	6h - 14h - 22h
	Entre 10h et 18h	22h	
	Entre 18h et 00h	6h le lendemain	
Infuseur, seringue ou gravité – patient non autonome : <u>Administration par le CLSC</u> (à domicile ou aux services courants)			
DIE	Entre 3h et 22h	10h le lendemain	10h
	Entre 22h et 00h	Le lendemain autour de 15h puis le surlendemain à 10h	
	Entre 00h et 3h	Le même jour autour de 15h puis le lendemain à 10h	

*Les heures d'administration peuvent varier selon la clinique jugée pertinente par un professionnel de la santé dans des cas particuliers (par exemple : pédiatrie, insuffisance rénale sévère).

Heures visées pour ATIVAD chez l'adulte*

Ce tableau exclut : acyclovir, amikacine, amphotéricine B, colistiméthate, ganciclovir, gentamicine, tobramycine, vancomycine. Pour ces antibiotiques ou si administration par perfusion prolongée est souhaitée, contacter le pharmacien.

Posologie	Heure de début de la dernière dose	Heure de la prochaine dose à programmer sur la pompe	Heure(s) visée(s)
Pompe – patient autonome et non autonome			
Aux 12 heures	Entre 00h et 12h	18h	6h - 18h
	Entre 12h et 00h	6h le lendemain	Changement de sac : après la fin de la perfusion de 6h et avant 17h30
Aux 8 heures	Entre 2h et 10h	14h	6h - 14h - 22h
	Entre 10h et 18h	22h	Changement de sac : après la fin de la perfusion de 6h et avant 13h30
	Entre 18h et 2h	contacter le pharmacien, une dose pourrait s'avérer nécessaire avant de programmer la pompe	
Aux 6 heures	Entre 3h et 9h	12h	00h-6h-12h-18h
	Entre 9h et 15h	18h	Changement de sac : après la fin de la perfusion de 6h et avant 11h30
	Entre 15h et 21h	00h	
	Entre 21h et 3h	contacter le pharmacien, une dose pourrait s'avérer nécessaire avant de programmer la pompe	
Aux 4 heures	Entre 5h et 9h	11h le même jour	3h-7h-11h-15h-19h-23h
	Entre 9h et 13h	15h le même jour	Changement de sac : après la fin de la perfusion de 7h et avant 10h30
	Entre 13h et 17h	19h le même jour	
	Entre 17h et 21h	23h le même jour	
	Entre 21h et 5h	contacter le pharmacien, une dose pourrait s'avérer nécessaire avant de programmer la pompe	

*Les heures d'administration peuvent varier selon la clinique jugée pertinente par un professionnel de la santé dans des cas particuliers (par exemple : pédiatrie, insuffisance rénale sévère).