



**ORDONNANCE INDIVIDUELLE**

Sélectionner un choix pour chaque classe de médicaments.

**ANXIOLYSE**

- Midazolam 1 mg/ml 1 x 10 mg (10ml en seringue)  
2,5 à 10 mg (2,5 à 10 ml) IV en 2 minutes, à titrer selon la réponse de l'utilisateur.

**ANESTHÉSIQUE LOCAL****En 1<sup>re</sup> intention**

- Lidocaïne sans épinéphrine 20 mg/ml 40 mg (2 ml en seringue) IV en 30 secondes.

**OU****En 2<sup>e</sup> intention, si allergie à la lidocaïne**

- Sulfate de magnésium 500 mg/ml 1000 mg (2 ml en seringue) compléter ad 10 ml avec NaCl 0,9%  
Administrar en injection IV lente (5 minutes).

**INDUCTION DU COMA****En 1<sup>re</sup> intention**

- Propofol 10 mg/ml 4 x 500 mg (50 ml en seringue). Utiliser 2 seringues de 500mg en injection IV lente (5 minutes). En cas de doute sur l'induction du coma, augmenter la dose.

**OU****En 2<sup>e</sup> intention**

- Phénobarbital 120 mg/ml 2 x 3000 mg (25 ml en seringue) compléter ad 50 ml avec NaCl 0,9% et administrer en injection IV lente (5 minutes). En cas de doute sur l'induction du coma, augmenter la dose.

**BLOQUEUR NEUROMUSCULAIRE**

- Bésylate de cisatracurium 2 mg/ml 30 mg (15 ml en seringue) IV rapide

**OU****Alternatives de traitement**

- Bésylate de atracurium 10 mg/ml 100 mg (10 ml en seringue) IV rapide

**OU**

- Bromure de rocuronium 10 mg/ml 200 mg (20 ml en seringue) IV rapide

**RINÇAGE DU DISPOSITIF D'INJECTION**Rincer le dispositif d'injection avec une solution saline **avant de commencer le protocole, après administration de l'inducteur de coma, et après injection du bloqueur neuromusculaire.**

- NaCl 0,9% 1 x 10 ml IV pour vérifier la perméabilité du cathéter  
1 x 10 ml IV après injection de l'inducteur de coma  
1 x 10 ml IV après l'injection du bloqueur neuromusculaire  
1 x 10 ml seringue supplémentaire, à utiliser si besoin

**DOCUMENTS À JOINDRE À L'ORDONNANCE**

- Profil pharmacologique à jour  
 Formulaire de demande d'AMM dûment rempli

**ENVOI DE L'ORDONNANCE AU PHARMACIEN**

- En installation**, télécopier l'ordonnance individuelle standardisée à la pharmacie de votre installation.  
 Appeler le pharmacien de votre installation afin de s'assurer de la réception de l'ordonnance.
- À domicile**, télécopier l'ordonnance individuelle standardisée à la pharmacie distributrice au 418-435-0012.  
 Appeler à la pharmacie distributrice au 418-435-9338 afin de s'assurer de la réception de l'ordonnance.

- Déposer l'original de l'ordonnance au dossier de l'utilisateur.

Pour toutes questions relatives à la gestion de l'ordonnance individuelle ou des conseils pharmacologiques, communiquer avec le pharmacien.

Pour toutes autres questions, contacter le groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) au 418-641-3778.

Date \_\_\_\_\_  
aaaa/mm/jj

Signature médicale \_\_\_\_\_