

Tableau clinique?

≥ 1 des symptômes suivants?

- Perte subite du goût ou de l'odorat
- Toux nouvelle ou aggravée
- Dyspnée
- Fièvre > 38
- Mal de gorge

OU

≥ 2 des symptômes suivants?

- Fatigue intense
- Douleurs musculaires généralisées
- Céphalée
- Perte d'appétit importante
- Nausées ou vomissements
- Diarrhée
- Douleur abdominale
- Rhinorrhée
- Congestion nasale

Lien épidémiologique?

(Risque d'avoir contracté la COVID < 10jrs)

- En vivant sous le même toit qu'une personne confirmée COVID ?
- En côtoyant une personne confirmée COVID sans mesures de protection à moins de 2 mètres durant 15 minutes et plus ?
- En ayant fréquenté un milieu déclaré en éclosion de la COVID ?
- Retour de voyage à l'étranger < 15 jours ?

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ET PROTOCOLES

Applicable en zone verte, jaune et orange

Contexte clinique	EPI	Protocoles applicables
COVID confirmé: COVID positif < 10 jours (par test rapide ou PCR)		
COVID suspecté Tableau clinique (+) <u>OU</u> Lien épidémiologique (+)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPI de base* ■ Jaquette ■ Masque N-95 	Protocoles réguliers (ex: Nébulisation, REA habituel, ventilation sans circuit fermé)
Non suspecté: Tableau clinique (-) <u>ET</u> Lien épidémiologique (-)	<ul style="list-style-type: none"> ■ EPI de base* 	
Indéterminé: Questionnaire impossible		

*EPI de base: Masque de procédure, lunette, gants

Ajouter un masque N95 et une jacquette si :

- S/s respiratoires sévères ou s/s choc ou « V-P-U » (risque d'IMGA).
- Intervention médicale générant aérosols (IMGA) : Aspiration trachéale; Intubation/extubation; Assistance respiratoire; /ventilatoire; Soins de trachéostomie; RCR, DVR / laryngoscopie.
- Intervention dans une zone cohortée COVID + (2 patients ou +).