







TEMPS D'ATTENTE DU RÉSULTAT DE L'ANALYSE DE LA CARCASSE AVANT DE DÉBUTER LA PROPHYLAXIE POSTEXPOSITION (PPE)

Adapté du document du MSSS 2015

Animal impliqué	Site de la morsure	Comportement	Niveau de risque dans le secteur géographique*	Temps d'attente (à partir de la morsure)	
 DOMESTIQUE 	Tête et cou	⚠	Élevé	Le plus court possible	
			Moyen		
			Faible		
	Normal	Élevé	48h		
		Moyen			
		Faible		Jusqu'au résultat***	
Autres sites	⚠	Élevé	48h		
		Moyen			
		Faible			
	Normal	Élevé	48h		
		Moyen		72h	
		Faible			Jusqu'au résultat***
 MAMMIFÈRE SAUVAGE TERRESTRE	Tête et cou	⚠	Élevé	Le plus court possible	
			Moyen		
			Faible		
		Normal	Élevé	Le plus court possible	
			Moyen		
			Faible		48h
	Autres sites	⚠	Élevé	48h	
			Moyen		
			Faible		
		Normal	Élevé	48h	
			Moyen		
			Faible		Jusqu'au résultat***
 CHAUVÉ-SOURIS****	Tête et cou	N/A	N/A	Le plus court possible	
	Autres sites	N/A	N/A	48h	
 GROS RONGEUR / LAGOMORPHE 	Tête et cou	⚠	Élevé	Le plus court possible	
			Moyen		
			Faible		
		Normal	Élevé	48h	
			Moyen**		Jusqu'au résultat***
			Faible**		
	Autres sites	⚠	Élevé	48h	
			Moyen		72h
			Faible		
		Normal	Élevé	48h	
			Moyen**		
			Faible**		Jusqu'au résultat***

⚠ **Comportement compatible avec la rage** : agressivité inhabituelle ou difficulté à marcher ou paralysie ou démarche chancelante ou familiarité anormale avec l'humain.

N/A = Non applicable

* Pour connaître la présence de rage ou le niveau de risque du secteur géographique d'où provient l'animal, consultez le site Web de l'INSPQ :
 Sud du Québec : www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage#sud_du_quebec Nord du Québec : www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage#nord_du_quebec

** Dans ces situations, l'analyse de l'animal n'est pas requise.

*** Attendre le résultat de l'analyse de la carcasse de l'animal.

**** Le risque de rage chez la chauve-souris est élevé sur tout le territoire du Québec.