



## Prise en charge d'un patient présentant à l'électrocardiogramme (ECG) un message associé à un infarctus aigu du myocarde

**\*\*\* Applicable pour la région 03 uniquement\*\*\***

À la suite du déploiement du moniteur défibrillateur Zoll X-Series, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale tient à apporter des précisions concernant la prise en charge d'un patient présentant à l'ECG un des messages associés à un infarctus aigu du myocarde :

**\*\*\* IM AIGU \*\*\*** et **\*\*\* IDM ss-dc seg ST \*\*\***

Lorsque vous observez l'un de ces messages sur le tracé de l'ECG, vous devez contacter l'unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) **avant** l'installation des électrodes de défibrillation.

L'aspirine pourra être administrée, comme indiqué selon les PICTAP (MED 10), si le patient présente une douleur thoracique d'origine cardiaque probable (DTCOP).

En l'absence de DTCOP, l'aspirine devra être administrée seulement si l'UCCSPU confirme l'infarctus aigu du myocarde, comme indiqué par la directive régionale déjà en place.

À titre de rappel, voici les autres messages devant être transmis à l'UCCSPU :

<i>Repolarisation précoce</i>	<i>Suspicion d'infarctus aigu</i>
<i>Péricardite</i>	<i>Segment ST sus-décalé</i>

Pour toutes questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec un instructeur clinique.

Merci de votre collaboration habituelle!

Douglas Eramian M.D. FRCP(C)  
Directeur médical régional des services préhospitaliers d'urgence