

Tableau des manifestations cliniques permettant de déterminer le stade de la syphilis

PRINCIPAUX STADES DE LA SYPHILIS PRÉCOCE – PÉRIODE INFECTIEUSE			 Photos disponibles
Stade	Période d'incubation	Manifestations cliniques les plus fréquentes	
Syphilis PRIMAIRE	10 à 90 jours (en moyenne 3 semaines après l'infection)	• Chancres uniques au site d'inoculation (p. ex. génital, anal ou oral) • Chancres multiples également possibles • Adénopathie régionale	
Syphilis SECONDAIRE	Généralement 2 à 12, voire 24 semaines après l'infection	• Éruption cutanée généralisée • Lésions cutané-muqueuses buccales, linguales ou génitales (p. ex. plaques muqueuses) • Condylomes plats (<i>condyloma lata</i>) • Lymphadénopathie généralisée • Syndrome d'allure grippale : fièvre, malaise, céphalée, myalgie, arthralgie, fatigue • Alopécie • Atteinte d'organe, comme l'hépatite (plus rare) • Manifestations neurologiques (voir NEUROSYPHILIS)	
Syphilis LATENTE PRÉCOCE	Début de l'infection situé à moins d'un an	• Asymptomatique • Récurrence possible de symptômes de syphilis SECONDAIRE	

PRINCIPAUX STADES DE LA SYPHILIS TARDIVE		
Stade	Période d'incubation	Manifestations cliniques les plus fréquentes
Syphilis LATENTE TARDIVE	Début de l'infection situé à plus d'un an	• Asymptomatique
Syphilis LATENTE DE DURÉE INDÉTERMINÉE	Début de l'infection inconnu	• Asymptomatique
Syphilis TERTIAIRE	De 5 à 40 ans après l'infection initiale	• Syphilis cardiovasculaire (ANNEXE 1) • Gomme syphilitique (ANNEXE 1) • Complications neurologiques (voir NEUROSYPHILIS)

NEUROSYPHILIS		
	Période d'incubation	Manifestations cliniques les plus fréquentes
NEUROSYPHILIS	Manifestations précoces : dans les premiers mois de l'infection ou dans un contexte de syphilis SECONDAIRE Manifestations tardives : 10 à 40 ans après l'infection ou dans un contexte de syphilis TERTIAIRE	• Méningite, syphilis méningo-vasculaire • Dysfonctionnement des nerfs crâniens • Anomalies otiques (ANNEXE 1) • Anomalies oculaires (ANNEXE 1) • Paralysie générale, <i>tabes dorsalis</i>

Référence : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/ITSS_Syphilis_WEB_FR.pdf

Si vous désirez plus d'information ou du soutien pour certaines de vos interventions, vous pouvez joindre le service de prévention et protection des maladies infectieuses au 418 666-7000, option 3 suivi de l'option 1