


Fentanyl - Médétomidine

Avis – Depuis le début du mois d’avril, plusieurs situations préoccupantes ont été observées sur le territoire de la Capitale-Nationale, en lien avec une substance vendue comme étant du fentanyl sous forme de granules.

Quelques cas de surdoses ont été signalés. Nous avons aussi recensé plusieurs situations où des personnes ont présenté des signes laissant craindre une surdose imminente, sans qu’une réelle surdose ne se produise.

À ce stade, les analyses indiquent que de la **médétomidine** pourrait être présente dans le fentanyl, soit en raison d’une contamination, soit d’une modification de la composition des substances en circulation.

Médétomidine	Fentanyl
Sédatif et analgésique utilisé chez les animaux	Opioïde synthétique
<ul style="list-style-type: none"> • Endormissement • ↓respiration • Pupilles dilatées • Bouche sèche • Contractions musculaires • Hypothermie (↓température) • ↓tension artérielle • ↓battements du cœur 	<ul style="list-style-type: none"> • Euphorie • Confusion • Étourdissement • Endormissement • Nausées / vomissements • ↓respiration • Perte de conscience • Dépression respiratoire • Mort
PAS D’ANTIDOTE	20 à 40 fois plus puissant que l’héroïne!
	Antidote : Naloxone



RAPPEL DES PRATIQUES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

- ✓ **TESTE tes substances au service de vérification de substances (SVS) mobile de la Coop SABSA**

Horaire ou prise de RV :  Clinique Mobile SABSA, cell. : 581 995-2934

- ✓ **Utilise le service de consommation supervisée (SCS), L'Interzone.**
- ✓ **Ne reste pas seul** (pendant et après avoir consommé). Conso solo = ↑ risque de décès!
- ✓ Si tu consommes seul, **avise un ami/un proche et garde le contact** (textos ou téléphone) ou utilise les services ADPS – Accompagne à Distance en Prévention des Surdoses (téléphone ou visioconférence) : 1 800-265-2626, option 2 – adps.ca
- ✓ Évite de consommer plusieurs substances en même temps;
- ✓ **Diminue la dose pour voir l'effet** ou fais une dose d'essai;
- ✓ **Garde de la naloxone avec toi et quelqu'un qui sait l'utiliser près de toi!**
- ✓ **Appelle le 911 en cas de surdose** (Loi sur les bons samaritains secourant les victimes protège un témoin contre les poursuites pour possession simple);

RECONNAÎTRE ET RÉAGIR À UNE SURDOSE D'OPIOÏDES

Une personne **perd connaissance et ne se réveille pas** après avoir consommé :

1. Tente de la réveiller! Parle fort, secoue-la ou crée une petite douleur (ex. : pincer la peau).
2. Si elle ne se réveille pas → **APPELE LE 911!** Et demande de l'aide autour de toi!
3. Administre la naloxone si possibilité d'opioïdes (consommation ou contamination).
4. Pratique la réanimation cardiorespiratoire si tu es capable/formé pour le faire.
5. Répète la naloxone 3 minutes plus tard si pas de réaction/réveil.
6. Reste avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours!



Pour nous communiquer des renseignements : surdoses.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca.

Pour plus d'information : ciusscn.ca/preventionsurdoses